



JOURS ET SEMAINES HEURES DE LUMIÈRE	PHASE VÉGÉTATIVE				PHASE GÉNÉRATIVE						
	ENRACINEMENT		I		I			II	III	IV	
	J1-5	J6-25	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosage en ml par 10 L											
CANNA COCO A	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
CANNA COCO B	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
CANNA RHIZOTONIC XP	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
mS/cm											
EC DE L'EAU	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
EC NUTRIMENTS	1.4 - 1.8	1.4 - 1.8	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	2.0 - 2.5	1.4 - 1.8	1.4 - 1.8	
EC TOTALE	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	2.0 - 2.4	2.0 - 2.4	2.0 - 2.4	2.0 - 2.4	2.0 - 2.4	2.4 - 2.9	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	0.4

Ce calendrier de culture est conçu pour les plantes qui développent des fleurs ou des fruits, à partir d'une bouture ou d'un semis âgé d'une semaine.
La durée de chaque phase peut varier selon l'espèce.

- * Doublez le dosage de CANNAZYM à 50 ml/10 litres, si le substrat est réutilisé.
- ** Augmentez le dosage de CANNABOOST à 40 ml/10 litres au maximum pour stimuler davantage la floraison.

Pour une phase de croissance prolongée, répétez les dosages recommandés de la période d'enracinement II (J6-25). Pour une phase de floraison prolongée, répétez les dosages recommandés de la phase générative I (S3-S5).
Ajoutez le CANNA PK 13/14 durant la période de 3 à 4 semaines avant la récolte.

