

CAN CANN CANN



GUIDE DE CULTURE



	PHASE VÉGÉTATIVE				PHASE GÉNÉRATIVE						
	ENRACINNEMENT		1		T.			П	Ш	IV	
JOURS ET SEMAINES	J1-5	J6-25	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	S9
HEURES DE LUMIÈRE	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Dosage en ml par 10 L										
NNA SUBSTRA VEGA A (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
NNA SUBSTRA VEGA B (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
IA SUBSTRA FLORES A (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
IA SUBSTRA FLORES B (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC XP	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
	m\$/cm										
EC de l'eau	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
EC NUTRIMENTS	1.4 - 1.8	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	1.6 - 2.0	2.0 - 2.5	1.4 - 1.8	1.2 - 1.6	
EC TOTALE	1.6 - 2.0	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	1.8 - 2.2	2.2 - 2.7	1.6 - 2.0	1.4 - 1.8	0.2

Ce calendrier de culture est conçu pour les plantes qui développent des fleurs ou des fruits, à partir d'une bouture ou d'un semis âgé d'une semaine. La durée de chaque phase peut varier selon l'espèce.

- * Doublez le dosage de CANNAZYM à 50 ml/10 litres, si le substrat est réutilisé.
- ** Augmentez le dosage de CANNABOOST à 40 ml/10 litres au maximum pour stimuler davantage la floraison.

Pour une phase de croissance prolongée, répétez les dosages recommandés de la période d'enracinement II (J6-25). Pour une phase de floraison prolongée, répétez les dosages recommandés de la phase générative I (\$3-\$5). Ajoutez le CANNA PK 13/14 durant la période de 3 à 4 semaines avant la récolte.



